

## ГЛОССАРИЙ ТУБЕРКУЛЁЗ

- Абациллирование** – прекращение выделения микобактерий туберкулеза, подтвержденное серийными анализами на МБТ после бактерио-выделения.
- Активный процесс (форма, больной)** – туберкулезный процесс, при котором возможно прогрессирование заболевания, заражение других индивидов; больной нуждается в активном адекватном лечении.
- Амилоидоз** – отложение амилоида в паренхиматозных органах.
- Ателектаз** – спадение части или всего легкого вследствие нарушения вентиляции, обусловленное закупоркой бронха или сдавливанием легкого.
- Бактериовыделитель** – пациент с активным туберкулезным процессом, в мокроте, моче и др. выделениях которого удается обнаружить микобактерии туберкулеза. Обозначается как МБТ +, БК +. Бактериовыделителя называют также бациллярным больным.
- Вакцина БЦЖ** – препарат живых ослабленных микобактерий, утративших вирулентность.
- Вакцинация БЦЖ** – первое введение вакцины БЦЖ с целью выработки активного иммунитета против туберкулеза.
- Вираз туберкулиновой пробы** – впервые выявленная положительная туберкулиновая проба после предыдущих отрицательных.
- Деструкция** – (лат. destructio - нарушение, разрушение структуры) - распад в фокусе туберкулезного процесса.
- Диссеминация** – (лат. disseminatio — сеяние, распространение) - рассеивание, распространение туберкулезного процесса лимфогенным, гематогенным, спутагенным (с мокротой) путями с образованием новых очагов в легких.
- Закрытая форма (туберкулеза)** – туберкулез, протекающий без бактериовыделения. Обозначается МБТ –, БК
- Интоксикация туберкулезная** – комплекс симптомов «отравления» организма, вызванных жизнедеятельностью микобактерий туберкулеза.
- Инфицированность** – понятие зараженности туберкулезной палочкой; не всегда соответствует болезни. Вероятность развития туберкулеза в этом случае резко повышается.
- Искусственный пневмоперитонеум** – введение воздуха в брюшную полость для подъема и ограничения подвижности диафрагмы и иммобилизации легких.
- Искусственный пневмоторакс** – введение воздуха в плевральную полость для сдавливания больного легкого.
- Каверна** – полость в легком, образованная в результате туберкулезного распада.
- Кавернотомия** – вскрытие каверны с последующим открытым ее лечением.
- Казеоз (казеозный, творожистый распад)** – специфический распад при туберкулезе с образованием «творожистых» масс.
- Коллапсотерапия** – сдавливание легкого воздухом с лечебной целью.

- Контакт семейный** – наличие туберкулезного больного в семье, значительно увеличивающее риск заражения для окружающих.
- Контактный** – пациент, имеющий связи с туберкулезным больным в активной фазе.
- Кровохарканье** – выделение мокроты с прожилками крови или окрашенной кровью мокроты (до 50 мл/сут).
- Легочное кровотечение** – выделение алой пенистой крови из дыхательных путей (более 50 мл/сут).
- Микобактерия туберкулеза** – возбудитель туберкулеза (МБТ); **бацилла Коха (БК)** – устаревшее название.
- Милиарный (туберкулез)** – гематогенно-диссеминированный туберкулез, характеризующийся равномерным высыпанием в легких просовидных бугорков и поражением многих систем и органов.
- Неактивный процесс (форма, больной)** – туберкулезный процесс стабилизируется, исчезает вероятность инфицирования окружающих.
- Открытая форма** – туберкулез, протекающий с бактериовыделением, обозначается МБТ +, БК +.
- Очаг** – место проживания больного туберкулезом.
- Очаг Гона** – кальцинат на месте туберкулезного процесса.
- Первичный туберкулезный аффект** – участок специфического воспаления в месте внедрения МБТ.
- Первичный туберкулезный комплекс** – сочетание первичного туберкулезного аффекта со специфическим воспалением лимфатических сосудов (лимфангоит) и регионарных лимфоузлов (бронхоаденит).
- Проба Манту** – специфический диагностический тест, основанный на внутрикожном введении туберкулина, применяемый при массовых обследованиях с целью выявления инфицированных лиц и больных туберкулезом.
- Ревакцинация БЦЖ** – повторное введение вакцины БЦЖ при ослаблении иммунитета против туберкулеза, о чем свидетельствует отрицательная реакция Манту.
- Реинфекция** – повторное заражение на фоне перенесенного когда-то туберкулеза, возникающее эндогенным и экзогенным путем.
- Туберкулезный больной** – пациент, которому установлен диагноз туберкулеза.
- Туберкулин** – препарат из белковой фракции туберкулезной палочки, используемый для диагностики туберкулеза.
- Туберкулинодиагностика** – метод выявления специфической сенсibilизации организма к туберкулезу путем введения через кожу туберкулина и оценки величины и характера развивающегося при этом отека.
- Фтизиатрия** – область клинической медицины, изучающая туберкулез.
- Эпидкарта** – план оздоровления очага туберкулеза.